

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Dospělí chrousti jsou středně velcí, červeno-hnědí brouci dlouzí 13 – 15 mm.
- Ponravy – jejich larvy, se často nacházejí v trávniku.
- Dospělý chroust klade vajíčka v červnu – červenci, larvy se živí na kořenech trávy od července do září.
- Od listopadu leží zavrtány v dormanci hluboko pod povrchem. Na jaře se přesunou zpět ke kořenům a na povrch, kde se objeví jako dospělí jedinci-brouci.
- Poškození je nejviditelnější v srpnu a září (larvální stadium).
- Prvním symptomem je náhlé řídnutí trávniku, žloutnutí a zeslabení trav, následuje nepravidelné odumírání v rozsahu větších ploch.
- Jak poškození pokračuje, odumřelé plochy se zvětšují a trávník začíná vadnout.

### ŘEŠENÍ

1. Kontrolujte aktivitu larev v srpnu-září.
2. Monitorujte trávník na podzim, hlavně z důvodu sekundárního poškození od ptáků.



### i-TURF SOLUTIONS

Typ produktu	Proč	Everris řešení
Biologický produkt s parazitickými háďátky	Kontrola ponrav v prvních stádiích, kdy jsou u povrchu.	Nemasys G

Pro informace o ponravách navštivte [www.scottspprofessional.com/iTurf](http://www.scottspprofessional.com/iTurf), [www.engo.sk](http://www.engo.sk)