


Dolarová skvrnitost

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Kostřavy (Festuca) jsou nejvíce napadány dolarovou skvrnitostí.
- Skvrny o velikosti 25 – 50 mm v průměru; propadlé, s barvou slámy, jednotlivé listy mají vybledlé místa poškození s rudě-hnědým okrajem, v ranních hodinách lze pozorovat mycelium.
- Choroba je iniciována: dlouhodobou vlhkostí na listech ve srovnání se suchou půdou, vysokou vlhkostí vzduchu s teplotami 21 – 26 °C, ranní rosou, nízkým hnojením dusíkem, nadměrnou plstí, častým kosením.

ŘEŠENÍ

1. Redukujte čas, kdy jsou listy vlhké.
2. Udržujte vyrovnané dávky hnojení preventivně, ale i na podporu regenerace.
3. Provdzdušňujte, aby jste zajistili neutuženou půdu.
4. Programově redukuje plst'.
5. Odvážejte odřezky po sečení zasažených oblastí.
6. Používejte fungicidy jako součást integrovaného programu, mějte na zřeteli možnost rezistence, střídejte proto přípravky z různých skupin.



i-TURF SOLUTIONS

Typ produktu	Proč	Scotts řešení
Smáčedla s penetrujícím účinkem	Redukují období s vlhkými listy.	H2Pro Maximise
Smáčedla	Zajišťují rovnoměrnou vlhkost půdy.	H2Pro
Kvalitní hnojiva	Podporují zdravý trávník.	hnojiva Scotts (různá)
Hnojiva obsahující dušík	Pomohou preventivně, pomůžou při regeneraci.	Greenmaster; Spring & Summer Sierraform GT; Momentum Greenmaster Liquid; High N
Bioestimulanty s karbohydráty a mořskými řasami	Podporují mikrobiální aktivitu a tím pomáhají redukovat plst'.	Vitalnova / Greenmaster Blade
Povolené fungicidy.	Preventivní, nebo kurativní ošetření.	Banner MAXX Daconil Weather Stik.